Ressort: Gesundheit

Studie: Raucher erkranken häufiger am Grauen Star

Baierbrunn, 08.04.2015, 09:48 Uhr

GDN - Raucher erkranken laut einer schwedischen Studie häufiger am Grauen Star als Nichtraucher. Bei Rauchern, deren Linsen bereits Trübungserscheinungen zeigen, könne eine Operation womöglich vermieden werden, wenn sie konsequent auf Zigaretten verzichten, heißt es in der Studie, über die das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" berichtet.

Offenbar könne sich die Augenlinse nach dem Rauchstopp erholen, wenn die Trübung noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Der Graue Star wird in Deutschland etwa 650.000 Mal pro Jahr operiert.

Bericht online:
https://www.germandailynews.com/bericht-52630/studie-raucher-erkranken-haeufiger-am-grauen-star.html

Redaktion und Veranwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:
UPA United Press Agency LTD
483 Green Lanes
UK, London N13NV 4BS
contact (at) unitedpressagency.com
Official Federal Reg. No. 7442619